



Населяют проточные водоемы от Сьерра Леоне до района р. Конго.

Длина до 13 см.

Тело вытянуто в длину, эллипсоидное, сильно уплощено с боков. Боковая линия полная. Хвостовой плавник двухлопастной, имеется жировой плавник. Спина серо-коричневая, бок оливково-зеленого до желто-зеленого цвета с сильным серебристым блеском, брюхо розоватое. На хвостовом стебле на золотисто-серебристом поле черная полоса, которая, сужаясь переходит на хвостовой плавник. Верхняя часть радужной оболочки глаза блестящего красного цвета. Плавники от серо-желтоватого до красноватого цвета.

Самец крупнее, плавники красноватые, спинной плавник высокий, косицевидный, коричневатый. У самки плавники желтоватые, перед нерестом на 2 мм выступает яйцеклад.

Рыбы стайные, мирные, подвижные, немного пугливые, держатся в верхнем и среднем слоях воды, прыгучи, любят свет и чистую, богатую кислородом воду. Можно содержать в закрытом сверху общем аквариуме, который должен быть вытянут в длину, с плавающими растениями, уменьшающими пугливость рыб, местами с зарослями, но и достаточным местом для плавания у поверхности воды.

Вода: 23-26°C, dH 5-10°, pH 6-7.

Корм: живой с добавлением растительным, заменители. С грунта корм не берут.

Нас нерест сажают пару или группу рыб. Нерестовый аквариум длиной от 60 см для пары, с сепараторной сеткой и мелколистными растениями.

Вода: 26-28°C, dH 2-5°, pH 6-6,5.

После нереста (до 1000 икринок), который чаще происходит через 2-3 суток в утренние часы, рыб отсадить. Инкубационный период 6-8 суток, мальки плывут через 2-4 суток.

Стартовый корм: инфузории, коловратки (предпочтительнее), можно яичный желток.