



Населяют р. Амазонку с притоками и водоемы южнее вплоть до района Ла-Плата.

Длина до 15 см.

Тело с сильно уплощенной головой и передней частью туловища по направлению сверху вниз, переходящее в конусовидную форму и оканчивающееся умеренно вытянутым хвостовым стеблем. 3 пары усиков, причем пара усиков верхней челюсти длинная и достигает до середины грудного плавника. Плавники крупные, грудные плавники расположены горизонтально и снабжены мощным, зазубренным шипом.

Голова, передняя часть туловища, грудные плавники и брюшные плавники от светло- до серо-коричневого цвета с желтовато-белыми точками и штрихами. Задняя часть туловища и хвостовой стебель темно-коричневые со светло-коричневыми зонами и идущими по боку 3 рядами желтовато-белых шишечек, похожих на бородавки, средние из них со светлыми точками. Усики с рисунком под мрамор от светло- до темно-коричневого цвета. Спинной плавник и хвостовой плавник коричневые.

При рассматривании рыб сверху у самца между грудными плавниками и брюшными плавниками контур тела идет по прямой линии, а у самки выгнут. Перед нерестом самка становится бесформенно толстой (не принимать вспученность брюха за признак заболевания!).

Рыбы ведут ночной образ жизни, днем держатся в укрытии или зарываются в грунт. Можно содержать в общем аквариуме, но не с мелкими рыбами других видов, т.к. сомы могут на них напасть. Аквариум с грунтом из окатанного мелкого песка слоем 7-8 см (сверху можно положить слой торфа), с большим количеством укрытий и местами с густыми зарослями растений. Вечером слабое освещение, т.к. рыбы охотно собираются у места кормления.

Вода: 22-26°C, dH до 15°, pH 6-7, богатая кислородом.

Корм: живой (трубочника берут неохотно). Склонны к обжорству, не перекармливать.

Нерест парный или групповой (самцов больше), обычно в ночные или ранние утренние часы как в видовом, так и в нерестовом аквариуме длиной от 100 см для пары, устроенном как описано выше. Стимулирует нерест резкое снижение температуры или содержание зимой при пониженной температуре, а затем ее подъем до 24°C, замена 1/3 части воды свежей, падение атмосферного давления, усиление движения воды.

Вода: dH до 10°, KH до 2°, pH 6-6,5.

Самка мечет до 300 икринок, которые переносят в инкубатор с тем же составом воды и температурой 26-28°C или оставляют в видовом аквариуме соответственно повысив температуру (рыбы икру не трогают). Выклюнувшиеся через 26-72 ч личинки (выклев продолжается несколько часов) чувствительны к свету и прячутся в укрытии.

Мальки через 2 суток берут корм: коловратки, микрочерви. Они восприимчивы к грибковым заболеваниям.

Нерест можно стимулировать гормональной инъекцией.