Размер до 7 см.

Обитает в северных водоемах Австралии.

Самец окрашен ярче самки.

Все виды этого семейства первично морские. Далекие предки их проникли из морей в устья пресноводных рек и потом, поднявшись вверх по течению, расселились по водоемам. Некоторые из них затем опять спустились вниз по течению и стали жить в солоноватых водах. Но всех их объединяет любовь к чистой, проточной, солоноватой, слабощелочной воде и яркому солнечному свету.

Содержат стайкой в просторных аквариумах, умеренно засаженных растениями и ярко освещенных. Питается живым и сухим кормом, в том числе мелкими насекомыми. Необходимы фильтрация и аэрация воды. Вид уживается с любыми миролюбивыми рыбами. При этом следует учитывать, что для содержания радужной рыбки нужна жесткая и слабощелочная вода. Возможно содержание либо с другими представителями семейства, либо с мелкими африканскими цихлидами (например, юлидохромис орнатус), либо с живородящими карпозубыми.

Вода для содержания: dH выше 10°; pH от 7,0 до 8,0; t 21-24 °C. Воду подсаливают поваренной солью (1 столовая ложка на 10 л воды).

Разведение несложно, так как икрометание постоянное после достижения половозрелости. При массовом разведении желательно преобладание в стае самок. Икра закрепляется на растениях с помощью клейких нитей. Икру производители не поедают, поэтому разведение возможно в аквариуме для содержания. Достаточно перенести растения с икрой в отдельный отсадник.

Вода для разведения: dH около 15°; pH около 7,5; t 25-27 °C.

Нужен нерестовик на 25-30 л с пучком мелколиственных растений и точкой аэрации или фильтром. Производителей сажают на 7-10 дней и после выхода первых мальков отсаживают Инкубация икры длится 7-10 суток, личинки 2 суток висят на стенках аквариума и растениях, затем мальки начинают плавать. В это время их начинают кормить.

Стартовый корм - артемия.

Выкормить малька несложно если следить за качеством воды (особенно за значением pH). Каждая самка мечет в день 5-15 икринок. Половозрелости рыбы достигают после 7 месяцев.