



Населяют о. Суматра и район северо-западнее г. Сингапур. Держатся в канавах и болотах лесов.

Длина до 4 см.

Тело вытянуто в длину, стройное и гибкое, с боков уплощено. Спинной плавник и анальный плавник длинные. Основная окраска тела самца желтоватая до красноватой. На боку проходят 3 темные продольные полосы. Иногда выступают темные поперечные полосы в нижней части тела и блестящие зеленые точки на жаберной крышке. Брюшные плавники переливаются зелено-голубым цветом. Самка желтовато-коричневая. У готовой к нересту - полное и светлое брюхо. Рыбы дышат атмосферным воздухом с помощью жаберного лабиринта.

Мирные рыбы, держатся в среднем и нижнем слоях воды. Можно содержать в общем аквариуме, пещеры, местами заросли растений. Аквариум закрыть сверху, чтобы над поверхностью воды был теплый воздух, т.к. в противном случае рыбы захватывая холодный воздух могут простудиться.

Вода для содержания: 23-26°C, dH до 20°, pH 6-7,5.

Корм: живой.

Нерест парный в общем или в нерестовом аквариуме устроенном также.

Вода для разведения: 27-28°C, dH до 4°, pH 5-6,5.

Самка откладывает икру (до 50 шт) на потолок пещеры. За икрой ухаживает самец. В нерестовом аквариуме самку удаляют. Инкубационный период 2-3 суток, мальки плывут через 2-5 суток.

Стартовый корм: живая пыль.

Половая зрелость в 7 мес.