



Населяют низовья р. Иравади. Держатся в заросших растительностью водоемах. Самец длиной до 9 см, самка до 6 см.

У самца спинной плавник на конце заострен, у самки скруглен. Основная окраска тела красновато-коричневая с зелено-голубыми поперечными полосами на боку. Непарные плавники оливковые. Спинной плавник с каймой красного цвета.

Нитевидные лучи брюшных плавников у самца красноватые, у самки от бесцветных до голубоватых.

Самец строит гнездо из пены в открытой воде.

Нерест может быть в общем аквариуме, но предпочтительнее в нерестовом, с несколькими кустами растений с удлиненным стеблем и рассеченными листьями, достигающими поверхности воды и плавающими растениями. Уровень воды 10 см.

Стимулирует нерест предварительное содержание самок и самцов отдельно в течение 1-2 недель, более мягкая свежая вода и повышение температуры на 2-3°C. На нерест сажают пару (аквариум от 40 см длины) или группу рыб с преобладанием самок. Самец строит гнездо из пены, под которым происходит нерест.

Самку обычно удаляют. Самец охраняет икру и личинки. Гнездо с икрой можно перенести в инкубатор, но в этом случае самец может потерять способность ухаживать за потомством. Инкубационный период 20-48 ч, мальки плывут через 2-5 суток, после чего самца удаляют.

Стартовый корм: инфузории, коловратки.

Самка мечет до 1500 икринок.