



Населяют Бирму, Малайзию, Таиланд и о. Суматра. Держатся у тихих берегов рек и ручьев.

Длина до 6 см.

Тело лишь немного уплощено с боков. 2 пары усиков. Спина серо-оливковая, бок серо-зеленый, серебристый и в зависимости от освещения отликает зеленоватым, голубоватым или фиолетовым цветом. Вдоль тела идет красная полоса с голубой окантовкой, которая с возрастом становится слабее и может совсем исчезнуть. Спинной плавник желтовато-зеленый, анальный плавник от вишнево- до оранжево-красного цвета, хвостовой плавник зеленоватый.

Самец окрашен интенсивнее, в середине хвостового плавника может быть вишнево-красное пятно. Самка значительно полнее, особенно перед нерестом.

Рыбы держатся во всех слоях воды.

Вода: 21-25°C, dH 5-15, pH 6,5-7,5.

Перед посадкой на нерест самцов и самок держат 7-10 дней отдельно и хорошо кормят живым кормом. На нерест можно сажать пару, но лучше 2 самцов и 1 самку или группу рыб с преобладанием самцов. Нерестовый аквариум от 30 л на пару рыб с сепараторной сеткой и мелколистными растениями. Вода свежая, с теми же параметрами, что и при содержании, уровень 8-10 см.

Рыб сажают вечером и поднимают температуру на 2-3°C. Нерест обычно происходит утром при восходе солнца или при включении освещения. После нереста рыб отсаживают, сетку и растения, отряхнув с них икру, убирают. Инкубационный период 2-5 суток, мальки плывут через 3-7 суток.

Стартовый корм: инфузории, коловратки.

Половая зрелость в 4-6 мес.