Населяют область верхнего течения р. Амазонка в Перу.

Длина самца до 10 см, самка до 6 см.

Основная окраска тела желто-зеленая, на боку 9-12 поперечных коричневого или коричнево-голубого цвета полос, переходящих на спинной плавник и анальный плавник. На хвостовом плавнике такого же цвета поперечные полосы. У самки более округлые плавники.

О. Рыбаков сообщает о возможности разведения в воде 26-27°С, dH 5-10°, pH 6,6-6,8.

Для увеличения продолжительности жизни до 8-12 мес. Самок и самцов держат раздельно, лишь помещая на непродолжительное время в нерестовый аквариум.

Нерест возможен как в общем, так и в нерестовом аквариуме объемом от 10 л для 1 самца и 2-3 самок. Грунт слой торфа высотой более длины рыбы, т.к. при нересте рыбы разываются в него. В общем аквариуме на грунт из гравия или песка ставят сосуды, наполненные торфом. Несколько кустов растений, чтобы самки могли спрятаться от самца. В крупный аквариум можно посадить на нерест группу рыб.

Кормовой участок остается свободным (можно отгородить камнями, что облегчит его очистку). При хорошем питании и периодической смене воды рыбы могут нереститься всю жизнь. Торф с икрой вынимают каждые 2 недели и заменяют новым. Вынутый торф кладут в сачок и отцеживают воду пока она не будет стекать по каплям, затем укладывают слоем 2-3 см и слегка подсушивают, но он должен сохранять достаточно влаги, чтобы еще впитать капли воды и быть расплывчатым. Торф с икрой хранят в закрытой стеклянной или пластмассовой посуде или в полиэтиленовом пакете при температуре 21-23°С.

Продолжительность диапаузы составляет обычно 3-6 месяцев.