Населяют мелкие места стоячих и медленно текущих вод штата Флорида (США).

Длина до 6 см.

Тело вытянуто в длину. Спинной плавник отнесен на заднюю половину туловища. Спинной плавник и анальный плавник довольно высокие и почти всегда расправлены, хвостовой плавник округлый.

Тело самца серо-зеленое до серо-коричневого, покрыто темным сетчатым рисунком. От рыла до хвостового плавника идет темная продольная полоса. Спинной плавник и анальный плавник блестящего голубого цвета, за исключением черных оснований и каймы. Хвостовой плавник у основания насыщенного красного цвета, наружная часть бесцветная.

Самка окрашена бледнее, от рыла до хвостового плавника идет насыщенного черного цвета продольная зигзаговидная полоса, на хвостовом стебле беловатое пятно. Плавники бесцветные. Спинной плавник может быть желтоватым.

Можно содержать в общем аквариуме, но лучше в видовом, группой. Аквариум хорошо засадить растениями.

Вода для содержания: 16-23°C, dH 8-15°, pH 6,5-7,2, благоприятно действует сезонное колебание температуры.

Корм: живой.

Нерест как в видовом, так и в нерестовом аквариуме от 30 см длины для пары рыб. Наиболее благоприятное время - весна, после зимнего понижения температуры. Перед посадкой на нерест самку и самца держат раздельно. Нерест среди мелколистных растений у поверхности воды длится около 5 недель, самка обычно каждый день мечет 3-8 икринок, которые нужно перенести в инкубатор, т.к. рыбы едят икру.

Инкубационный период 1-2 недели.

Стартовый корм: коловратки, науплии циклопов.