



Размер самца до 14 см, самка обычно мельче.

Обитает в горных реках Южной Америки.

Самец на конце рыльца имеет разветвленные отростки.

Анциструс - панцирный сомик, имеет рот с роговидными присосками, активно соскабливает водорослевые обрастания в аквариуме. Кроме этого, с удовольствием поедает любой живой и сухой корм. В рацион анциструса необходимо включать побольше растительного корма. Листья салата, одуванчика, капусты, крапивы ошпаривают крутым кипятком и опускают на дно аквариума, фиксируя их положение камнем. Сомики наиболее активны в сумерки, желательно в аквариуме иметь щели и укрытия в виде полостей. Тело анциструса покрыто костными пластинками, он хорошо защищен. Рыбы чрезвычайно миролюбивы, воют за территорию только самцы, не причиняя при этом друг другу никакого вреда. Этих рыб можно содержать с любыми, даже агрессивными, видами, но не очень крупными.

Вода для содержания: dH до 15° рН 6,5-7,5; t 22-24 °С.

Половозрелость наступает после года.

Вода для разведения: dH до 8°; рН 7,0; t 25-27 °С.

Для стимуляции нереста необходимы наличие полостей для икрометания, подмена воды свежей, лучше более мягкой и лишенной карбонатной жесткости. Желательно воду подменять в момент снижения атмосферного давления. Один самец может нереститься с несколькими самками. Самец занимает полость, самка выметывает туда икру янтарного цвета в виде грозди, которую охраняет самец. Самка мечет около 200 икринок. Личинки выходят на 5-6-й день. До этого момента икру вместе с укрытием целесообразно перенести в отсадник с водой того же состава. Рядом с икрой устанавливают распылитель. Малек начинает плавать на 8-9-й день.

Стартовый корм -артемия сухие, растительные корма и резаный трубочник. Сухие и растительные виды кормов необходимо растереть в порошок. Малек крупный, в первый месяц растет очень быстро, затем рост несколько замедляется.