



Населяют бассейн нижнего течения р. Амазонка.

Длина до 7 см.

Тело вытянуто в длину, умеренно уплощено с боков. Спинной плавник отнесен на заднюю половину туловища. Верхняя лопасть хвостового плавника обычно длиннее нижней. Спина оливково-коричневая, бок охряно-желтый, отликает зеленоватым блеском, брюхо беловатое, часто с красноватым оттенком. От рыла через глаз и жаберную крышку идет черная линия, оканчивающаяся на уровне грудных плавников. На боку 3 крупных черные пятна, расположенных у оснований брюшных, анального и хвостового плавников. Плавники бесцветные до слегка красноватых, на спинном плавнике темное пятно. Самец окрашен интенсивнее. Самка полнее.

Мирные, не очень подвижные рыбы, населяют верхний и средний слои воды, при беспокойстве прячутся в зарослях. Можно содержать в общем аквариуме (предпочтительнее длиной от 100 см) с зарослями и несколькими растениями с укороченным стеблем и широкими листьями, расположенными далеко друг от друга, т.к. самца в период нереста образуют вокруг них свою территорию.

Вода для содержания: 23-27°C, dH 5-20°, pH 6-7,5.

Корм: живой, заменители.

Нерест парный как в общем, так и в нерестовом аквариуме, в котором должно быть растение с укороченным стеблем и широкими листьями, на которые самка откладывает икру (до 300 шт.).

Вода для разведения: 26-28°C, dH до 7°, pH 6-6,8.

После нереста самку удаляют, самец ухаживает за икрой.

Инкубационный период 1-1,5 суток, мальки плывут через 4-5 суток.

Стартовый корм: инфузории, коловратки.