



Населяют бассейны рек Нигер и Огове.

Держатся в небольших водоемах с медленно текущей или стоячей водой, особенно вблизи берегов между различными укрытиями.

Длина до 8 см.

Тело короткое, высокое, сильно уплощено с боков. Рыло острое, рот нижний. Хвостовой стебель очень короткий. Окраска очень изменчива, темные пятна на охряном, зеленоватом или голубоватом фоне. От глаза идут темные полосы к рылу, горлу и началу спинного плавника. В период нереста окраска самца темнеет. У самки при готовности к нересту хорошо виден яйцеклад.

Хищные рыбы, агрессивны по отношению друг к другу и другим рыбам. Становятся активны в сумерки, днем обычно держатся в укрытиях.

Содержат в видовом аквариуме с густыми зарослями и плавающими растениями, коряги.

Вода для содержания: 24-28°C, dH 5-15°, pH 6-7.

Корм: мелкая живая рыба, головастики, дождевые черви и др. живой корм.

Нерестовый аквариум от 80 л для пары, с укрытиями для самки, с растением с крупными плавающими листьями Ø от 15 см или такого же размера пенопластом. Освещение очень слабое.

Вода для разведения: 26-28°C, dH до 7°, pH 6-6,8. Пару сажают на нерест как только у самки становится виден яйцеклад. Самец строит пенное гнездо под листом, куда пара откладывает икру (до 100 шт.), после чего самку удаляют.

Самец ухаживает за икрой и личинками. Инкубационный период 2,5 суток, мальки плывут через 2-5 суток, после чего самца удаляют.

Стартовый корм: живая пыль (коловратки, нематоды).

Мальков сортируют по размеру, т.к. каннибализм. Размножаются после 1 года.