



Населяют Индонезию, п-ов Малакка и Таиланд. Держатся в пресных и солоноватых ручьях и речках, а также в стоячей воде рукавов рек.

Длина самца до 6 см, самки до 7 см. Тело сильно вытянуто в длину, невысокое, профиль спины прямой, с боков уплощено. Рот верхний, нижняя челюсть вытянута далеко вперед. Спинной плавник и анальный плавник отнесены назад, почти к хвостовому плавнику.

Окраска зависит от места происхождения. Чаще встречаются 2 варианта:

- Основная окраска желто-коричневая с металлическим блеском.
- Основная окраска серебристая с голубоватым отливом. Нижняя челюсть с черной и часто еще с красной продольными линиями. У самца на спинном плавнике красное пятно.

У самца первые лучи анального плавника преобразованы в орган осеменения. Икра оплодотворяется в теле самки и ее покидают полностью сформировавшиеся мальки, которые сразу же берут корм.

Рыбы держатся в верхнем слое воды. Сначала самки и самцы соперничают друг с другом, но без серьезных травм. Затем устанавливается иерархия и слабейший подчиняется более сильному.

Можно содержать в общем аквариуме с рыбами сходного размера, но лучше в видовом, где дермогенисы полнее проявят себя. Аквариум закрытый сверху (рыбы прыгучи), с зарослями и плавающими растениями, но и достаточным местом для плавания. Аэрация, фильтрация.

Вода для содержания и разведения: 22-30°C, dH 8-20°, pH 7-8, можно добавить соль до 5 мг/л.

Корм: живой, заменители. Р. Курлянд рекомендует: "Три-пять капель раствора витаминов А, D, Е, F на масле (тетравит) пипеткой закапывают внутрь кормушки (100x100 мм). Желательно, чтобы капельки масла равномерно распределились по поверхности воды. Затем тонким слоем равномерно насыпаю в кормушку сушеную дафнию". Этот корм он дает после голодного дня.

Нерест в общем аквариуме. Во время беременности самки, которая длится 4-6 недель,

нельзя добавлять свежую воду в больших количествах, т.к. это вызывает преждевременные роды и большая часть мальков гибнет. Мальки прячутся от поедающих их взрослых рыб среди плавающих растений, откуда их можно выловить и перевести в выростной аквариум.

Для сохранения потомства беременную самку с припухшим анальным отверстием и полным брюхом можно перевести в отдельный аквариум с зарослями и плавающими растениями, откуда удал ить после родов. Самка мечет до 40 мальков.

Стартовый корм: живая пыль. Половая зрелость в 4 мес.