Населяют реки Колумбии.

Длина до 10 см, в аквариуме меньше.

Тело очень высокое, сильно уплощено с боков. Основная окраска зеленовато-коричневая с серебристым блеском, при возбуждении с красноватым оттенком. На задней половине тела до хвостового плавника идет неширокая красная продольная полоса. В передней части тела часто видно пятно красного цвета. Радужная оболочка глаза красная, пересекается черной вертикальной полосой.

У самца спинной плавник серповидно вытянут, красного цвета с широкой черной полосой. Анальный плавник у основания голубовато-белый, с темной каймой, первые лучи удлинены.

У самки спинной плавник с крупным черным пятном, анальный плавник красноватый, в передней части голубовато-белый.

Рыбы держатся в среднем слое воды, любят хорошее снабжение кислородом, плохо переносят большое количество свежей воды.

Корм: живой, заменители.

Нерест парный или в группе. Нерестовый аквариум с сепараторной сеткой на дне, на ней мелколистные растения с удлиненным стеблем.

Вода: температура на 2-3°С выше чем при содержании (25-27°С), dH до 4°, KH до 1°, pH 6-6,8, уровень 10-15 см.

Самцов и самок за неделю до посадки на нерест содержат раздельно. Нерест обычно утром. После нереста рыб удалить, аквариум затемнить. Инкубационный период 1-2 суток, мальки плывут через 3-5 суток. Дают слабое освещение.

Стартовый корм: инфузории, коловратки.

Половая зрелость в 8-12 мес.

При разведении трудно подобрать пару, лучше сажать на нерест группы рыб.