Размер до 4 см.

Обитает в притоках реки Амазонки.

У самки более полное брюшко. Из-за этого голубая полоса изогнута, а у самца она прямая.

Содержание несложно. К качеству воды и корму нетребовательны.

Вода для содержания: dH до 15°; pH 6,5-7,0; t 21-23°C.

Содержат в аквариумах, густо засаженных растениями. В центре оставляют свободный участок для плавания и кормления. Желательно стайное содержание. Рыбы едят любой некрупный живой и сухой корм. Для полноценной подготовки производителей желательны содержание в просторных аквариумах и разнообразный живой корм.

Вода для разведения: dH 2-4°; pH 6,2-6.4; t 22-24°C. Карбонатная жесткость - минимальная.

Нерестовик на 2 л с нерестовой решеткой на дне. Разведение парное. Освещение не нужно. Вода для нереста должна быть насыщена гуминовыми кислотами, дубильными веществами и с минимальной карбонатной жесткостью. Для этого в нее добавляют настой ольховых соплодий или торфа. Вода должна быть светло-янтарного цвета. Перед этим дистиллированную воду смешивают с кипяченой для получения требуемой жесткости.

После составления воды контролируют показатели dH, pH, и вода выстаивается в течение 10-15 дней. При подготовке нерестовика обязательно соблюдение чистоты. Нерестовик промывают с содой и тщательно ополаскивают несколько раз водой. Свет отрицательно влияет на развитие икры, поэтому нерест и развитие икры должны вестись в темноте. После икрометания производителей высаживают.

Если плохой икры много, то ее необходимо выбрать в полумраке пипеткой с оплавленным концом. Неоплодотворенная икра - белого цвета. Уровень воды в нерестовике понижают до 5 см. Слитую воду можно использовать для нереста еще раз, добавив свежей. После того, как мальки поплыли, необходимо их кормить и понемногу добавлять более жесткую воду из аквариума.

Стартовый корм для малька - коловратка.

По мере роста малька корм укрупняется, а его количество увеличивается.

Обычно самка мечет 100-150 икринок.