Населяют штаты Нью-Джерси и Мериленд (США).

Длина до 8 см.

По отливающему перламутром телу проходят темно-коричневые до черных поперечные полосы, между которыми разбросаны темные пятна. Плавники оранжевые, у спинного плавника первые лучи черные, у брюшных плавников за двумя первыми оранжевыми лучами идут два черных.

Вода для содержания: 15-20°С, понижение в зимние месяцы до 10-12°С укрепляет здоровье рыб и способствует наступлению нереста после повышения температуры, dH 8-20°, pH 6,5-8, чистая богатая кислородом.

Корм: живой.

Нерест парный, начинается весной после повышения температуры до 18-22°С. На нерест сажают пару, образовавшуюся в стайке рыб. Нерестовый аквариум длиной от 40 см, грунт - речной песок слоем 6-8 см, группы растений с рассеченными листьями.

Самец делает ямку в песке, куда самка откладывает икру, за которой он ухаживает. Икра может быть отложена и на растения. Самку после нереста удаляют. Инкубационный период 2-4 суток, мальки плывут через 4-7 суток. Самца удаляют, уровень воды понижают до 15 см и ниже.

Стартовый корм: инфузории, коловратки.

Мальков сортировать по размеру, каннибализм.

Могут размножаться после 1 года.