Населяют тропики экваториальной части западной Африки.

Длина до 4 см.

Тело умеренно вытянуто в длину, с боков слегка уплощено, профили спины и брюха равномерно выгнуты, боковая линия неполная. Хвостовой плавник двухлопастной. Спина оливково-коричневая, по боку проходит широкая темно-голубая до интенсивно зеленого цвета продольная полоса, на корне хвостового плавника узкая поперечная черная полоса. Плавники красные, анальный плавник с узкой черной каймой. У самки округлое брюхо, перед нерестом обычно видна икра.

Миролюбивые, не очень подвижные рыбы, держатся группой в затененных местах, предпочитают нижний слой воды, в жесткой воде окраска бледнеет. Предпочтительно видовой аквариум, местами заросли, укрытия.

Вода для содержания: 22-25ºC, dH 4-10º, pH 6-7.

Корм: живой.

Перед нерестом пару (можно 1 самца и 2 самки) держат 1-2 недели раздельно. Нерестовый аквариум длиной от 25 см с уровнем воды 10-15см, в затененной части обычно таиландский папортник и яванский мох. Некоторые аквариумисты кладут на дно сепараторную сетку.

Вода для разведения: 23-28ºC, dH 1-4º, pH 6-6,4.

Самка мечет до 300 икринок. Рыб удаляют, аквариум затемняют. Инкубационный период 24-36ч, мальки плывут через 3-5 суток. Включают слабую аэрацию для движения корма.

Стартовый корм: инфузории, коловратки. Половая зрелость в 7 мес.