



Населяют бассейн р. Конго.

Длина до 12 см.

Тело высокое, умеренно вытянуто в длину, профиль спины сильнее выгнут чем брюха. Хвостовой плавник двухлопастной. Имеется жировой плавник.

У молоди основная окраска тела от светло- до шоладно-коричневой, края чешуи блестят серебром, отдельные серебристые чешуи неравномерно разбросаны по всему телу. Спинной плавник спереди черный, по середине красный, сзади бесцветный. Анальный плавник у основания красный, края бесцветные. Хвостовой плавник коричневатый с бесцветным краем. Взрослые рыбы серебристые с желтоватым отливом, спина зеленовато-голубая. Плавники теряют окраску, у спинного плавника сохраняется черный передний край.

Довольно спокойные, мирные рыбы, держатся небольшими группами в нижнем слое воды. Обьедают растения. Можно содержать в общем аквариуме без растений, не со слишком подвижными рыбами, т.к. в этом случае пугливы.

Вода для содержания: 23-26°C, dH 5-15°, pH 6,5-7,5.

Корм: живой, растительный (не менее 20%), заменители.

На нерест сажают пару или 1 самца и 2 самки, которых перед посадкой в течение 1-2 недель держат раздельно и хорошо кормят только растительной пищей. Нерестовый аквариум длиной от 60 см, на дне на высоте 4-6 см сепараторная сетка, сильная аэрация.

Вода для разведения: 28°C, dH 5-12°, pH 6,5-7,5.

Нерест стимулирует резкий подъем температуры (28°C) и свежая вода. Нерестятся через 1-2 суток после посадки. Рыб после нереста удалить, т.к. поедают икру (до 1,5 тыс. шт.) и потомство.

Инкубационный период 24-40 ч, мальки плывут через 3-4 суток.

Стартовый корм: коловратки, мельчайшие науплии циклопа, микрочервь, аулофорус.

Мальки не любят сильного освещения.

Половая зрелость в 1-1,5 года.