



Длина до 15 см.

Тело в передней половине почти цилиндрической формы. Тело от нежно-желтого до желтовато-коричневого цвета, с 4 продольными полосами от темно-коричневого до черного цвета. Плавники от темно-коричневого до черного цвета.

Спинной плавник с черной каймой и голубоватой до белой полосой под ней. На хвостовом плавнике 3-4 ряда светлых точек .

Н. Опитц наблюдал как пара стала преследовать мальков после появления нового потомства.

Вода: 24-27°C, dH 7-20°, pH 7,4-8,5. А. Полонский рекомендует производить смену воды небольшими порциями 2-3 раза в неделю, чтобы за 1-1,5 недели сменилось 20-25% воды, но не более 10% каждый раз. Необходимо обратить особое внимание на удаление отходов и остатков корма, т.к. в процессе нитрификации образуется аммиак.

Корм: живой, заменители.

Нерест парный как в общем, так и в нерестовом аквариуме длиной от 50 см с пещерой, в которой пара откладывает икру (обычно около 50 шт.). Стимулирует нерест повышение температуры на 2-3°C и свежая вода. Рыбы не трогают икру и потомство. Инкубационный период 2-3 суток, мальки плывут через 4-8 суток и первое время держатся на территории родителей.

Стартовый корм: коловратки, науплии циклопа и артемии.

Половая зрелость в 7-12 мес.