



Населяют область от северной части Африки до верховьев р. Нил, оз. Киву и Танганьика. Держатся в артезианских колодцах пустынь, которые соединены друг с другом подземными водными системами и в водоемах оазисов.

Длина до 15 см, в аквариуме меньше.

Тело мощное, вытянуто в длину, профили спины и брюха почти симметрично выгнуты, бока немного уплощены. Голова острая, рот конечный, спинной плавник длинный.

Окраска из-за огромного района распространения различна. Основная окраска самца от серо- до красновато-желтой, может быть коричневатой, бок с голубым, зеленым или фиолетовым блеском. Через глаз идет черная вертикальная полоса, такие же полосы на лбу и рыле. Губы голубые. На боку в зависимости от условий среды и состояния рыбы может появляться рисунок из продольных и поперечных полос разной насыщенности.

Спинной плавник голубой или оранжевый с красноватыми пятнами и красной каймой. На анальном плавнике 4-10 светло-желтых икровидных пятен с черной каймой. Хвостовой плавник той же окраски, что и спинной плавник, но бледнее и с голубоватыми точками. Самка окрашена значительно менее интенсивно, чаще серебристая до голубовато-серой, иногда с 7-9 поперечными полосами. Икровидные пятна на анальном плавнике очень маленькие.

Самец крупнее самки, спинной плавник у него вытянут и заострен, а у самки он скруглен.

Рыб можно содержать в общем аквариуме с рыбами сходных размеров. Обязательно должны быть укрытия для самок, в которые не смог бы проникнуть самец, т.к. за исключением периода нереста он агрессивен. Можно мощные растения с хорошо развитой корневой системой. На каждого самца должно приходиться не менее 3 самок (лучше содержать одного самца).

Вода: 24-28°C, dH 8-20°, pH 6-8. (Сообщения о значении pH различны, одни указывают, что pH меньше 7, другие -- больше 7. Очевидно, это зависит от места происхождения рыб.

Корм: живой, заменители.

Нерест как в общем, так и в нерестовом аквариуме с грунтом, плоским камнем и

укрытиями. Икру откладывают на плоский камень или в ямку, которую делает самец.

Самка инкубирует икру во рту, скрываясь в укрытии от самца. Инкубационный период 2-3 недели.

Стартовый корм: науплии артемии, мелкий циклоп.