



Населяют лесные реки бассейна нижнего течения р. Конго.

Длина до 7 см.

Тело вытянуто в длину, умеренно высокое, уплощено с боков. Рот верхний. Спинной плавник высокий. Имеется жировой плавник. Тело самца прозрачное, желтовато-серое с зеленоватым, голубоватым и золотистым блеском. Плавники желтоватые. Спинной плавник серповидный, вытянутый в высоту. Средние лучи хвостового плавника могут быть немного удлинены, по середине идет темная продольная полоса в белом окаймлении. Тело самки прозрачное, желто-серое.

Рыбы мирные, стайные, подвижные, пугливые, держатся в верхнем и среднем слоях воды. Можно содержать в общем аквариуме, местами заросли и плавающие растения, создающие тенистые места, но и достаточное место для плавания.

Вода для содержания: 22-25°C, dH 5-20°, pH 6-7,5. Для рыб, предназначенных для разведения лучше dH до 10°, pH 6-7.

Корм: живой, замени тели (любят брать насекомых с поверхности воды).

На нерест обычно сажают 1 самца и 2-3 самки, которых предварительно держат раздельно около 2 недель. Нерестовый аквариум длиной от 80 см, уровень воды 15 см, на дне сепараторная сетка с кустами мелколистных растений.

Вода для разведения: 24-26°C, dH 2-4°, pH 6-6,5.

Нерест обычно начинается с первыми лучами солнца. Самка мечет до 500 икринок. После нереста рыб удаляют, уровень воды понижают до 5 см. Инкубационный период 5-8 суток, мальки плывут через 1-1,5 суток.

Стартовый корм: инфузории, коловратки.

Мальки плохо переносят загрязнения.