



Населяют южну. Часть п-ова Малакка, о-ва Суматра и Калимантан.

Держатся в прудах и канавах под защитой, свесившейся с берегов в воду растительности, а также в медленно текущих ручьях заросших растениями.

Длина до 6 см.

Тело умеренно вытянуто в длину, немного высокое, уплощено с боков, профиль брюха сильнее выгнут чем профиль спины, рыло острое. Спинной плавник и анальный плавник длинные, невысокие, брюшные плавники с нитевидно удлинненным первым лучом. Тело шоколадно-коричневого до слабого красно-коричневого цвета, отчасти немного отликает зеленоватым цветом. Чешуя с темной каймой. Все тело пересекают несколько светло-желтых до белого цвета поперечных полос. Анальный плавник с узкой желтой каймой.

Перед нерестом самец становится почти черным, у самки горло окрашивается в красноватый цвет.

Рыбы дышат атмосферным воздухом с помощью жаберного лабиринта. Они мирны по отношению к другим видам рыб, несколько пугливы, держатся в среднем и нижнем слоях воды, самцы драчливы между собой. Аквариум должен быть закрыт сверху, чтобы над поверхностью воды был теплый воздух, т.к. в противном случае рыбы захватывая холодный воздух могут простудиться. Заросли, плавающие растения.

Вода для содержания: 26-30°C, dH до 10°, рН 6-7, уровень до 20 см.

Корм: живой.

Нерест парный. В нерестовом аквариуме мелкий песок, кружась над которым рыбы током воды делают ямку и в нее самка мечет икру.

Вода для разведения: 28-30°C, dH до 3°, KH 0°, рН 5-6.

Самка инкубирует икру во рту, держась у поверхности под защитой плавающих растений. Самца удаляют. Мальки покидают рот самки через 14 дней.

Стартовый корм: живая пыль.