



Населяют центральную часть бассейна р. Парагвай.

Длина до 7 см.

Основная окраска тела серо-голубая, спина оливковая с голубым блеском, голова и грудь лимонно-желтого цвета, чешуя с темной каймой. На боку рисунок из темных полос меняется в зависимости от состояния рыбы и может исчезать. Плавники серо-голубые, по краю желтого до оранжевого цвета.

Самка в период ухода за потомством становится насыщенного лимонно-желтого цвета, полосы на голове, первые лучи спинного и брюшных плавников черные, анальный плавник с черной каймой.

Можно содержать в общем аквариуме вместе с небольшими очень подвижными рыбами, занимающими верхний и средний слои воды, которые будут выполнять роль враждебного фактора, побуждая самок защищать свое потомство. Местами заросли растений и различные укрытия (пещеры, нагромождение коряг), причем количество укрытий должно несколько превышать число самок. В крупном аквариуме можно содержать пары апистограмм разных видов.

Вода: 22-26°C, dH до 15°, pH 6,5-7,5.

Корм: живой, заменители.

Нерест как в общем, так и в нерестовом аквариуме, который должен быть не менее 15 л для пары, с грунтом, кустом растений и пещерой. Температуру поднимают на 2-4°C, ежедневно сменяют 1/5 объема воды на более мягкую и кислую.

Вода: 25-28°C, dH до 6°, pH 6,5 -6,8.

После нереста самца удаляют. Инкубационный период 3-6 суток.

Мальки плывут через 4-7 суток. Стартовый корм: живая пыль.