



Населяют Гайану и северную часть бассейна р. Амазонка. Держатся в богатых укрытиями водоемах с песочным дном.

Длина до 25 см, в аквариуме меньше.

Тело вытянуто в длину, относительно высокое, профиль брюха почти прямой, бока сильно уплощены. Голова и глаза крупные. Спинной плавник длинный, хвостовой плавник с прямым обрезом.

Спина темно-оливковая, бок желтоватый, зеленоватый или красноватый, с рядами золотистых или серебристых пятнышек, нижняя часть тела светлее. Иногда на боку появляются 7-8 темных поперечных полос. От конца рыла к глазу идут 2 темные полосы.

В верхней части корня хвостового плавника небольшое темное пятно. Плавники цвета тела со светло-голубыми или зеленоватыми пятнышками и штрихами. Пол можно надежно определить в период нереста. У самки яйцеклад крупный и тупой на конце, у самца семяпровод мельче и заострен.

Миролюбивы, постоянно "пережевывают" грунт, временами роют его, вырывая слабо укоренившиеся и плохо защищенные растения. Держатся в нижнем и среднем слоях воды.

Можно содержать в общем аквариуме, лучше с рыбами не образующими территорию, с грунтом из некрупного песка, жестколистыми растениями с укороченным стеблем и защищенными от выкапывания камнями, обязательно укрытия, а также плоские камни.

Вода для содержания: 24-26°C, dH до 25°, pH 6,5-7,5.

Корм: живой, растительный, заменители.

Нерест как в общем, так и в нерестовом аквариуме с грунтом из мелкого песка и плоскими камнями, на которые пара откладывает икру.

Вода для разведения: 28-30°C, dH до 12°, pH 6,3-7.

Через 24-20 ч после нереста обе рыбы берут икру в рот для инкубации, хотя некоторые самцы не делают этого. Икру вместе с камнем можно перенести в инкубатор, но тогда

рыбы могут потерять способность выращивать потомство. В это время некоторые любители не кормят рыб, т.к. бывают случаи поедания икры и личинок. Через 8-10 суток мальки впервые покидают рот родителей. Они очень пугливы.

Стартовый корм: живая пыль, нематоды.