



Населяют Габон и бассейн нижнего течения р. Конго.

Длина самца до 10 см, самка меньше.

Спина черновато-зеленая, бок оливковый до охряного. От рыла до хвостового плавника идет темная продольная полоса. Чешуя с темной окантовкой образует на теле сетчатый рисунок. Плавники ржаво-красного до светло-голубого цвета.

У самца брюхо красноватое. У самки брюхо красно-фиолетовое, нижняя часть головы золотистая. Перед нерестом передняя и задняя части брюха становятся насыщенного черного цвета. На задней части спинного плавника 2-3 черных пятна. Верхняя половина хвостового плавника с пятнами.

Вода: 22-25°C, dH 2-20°, pH 6-7,5.

Корм: живой, заменители.

Нерест как в общем, так и в нерестовом аквариуме, устроенном также.

Вода: температура на 2-3°C выше чем при содержании, dH 2-10°, pH 6-7.

Самка обычно мечет икру (до 300 шт.) в пещере, за которой ухаживает, самец охраняет территорию. Инкубационный период 3-6 суток. Мальки через 4-6 суток плывут под охраной родителей. Иногда между рыбами возникают драки из-за права ухода за мальками, тогда одну из них отсаживают.

Стартовый корм: живая пыль.

Половая зрелость в 8-12 мес.