



Населяют восточную и юго-восточную части Папуа-Новая Гвинея. Держатся в заводях небольших, медленно текущих рек.

Длина до 6 см.

Тело вытянуто в длину, постепенно сужается к хвосту, спереди округлое, в задней части сильно уплощено с боков.

Спина коричневая с красно-коричневого цвета червевидным рисунком, бок от насыщенного голубого до бирюзового цвета, с многочисленными узкими, красными, пунктирными поперечными полосами. У основания хвостового плавника черное пятно. Непарные плавники с красными пятнышками. Анальный плавник с желтой каймой.

Самец крупнее, голова с более крутой областью лба. У самки, особенно в период нереста, брюхо интенсивного желтого цвета.

Мирные рыбы, любят укрытия.

Можно содержать в общем аквариуме, пещеры, местами заросли растений. Желательная аэрация.

Вода для содержания: 22-26°C, dH 5-10°, pH 6-7,5.

Корм: живой, заменители.

Нерест парный. Нерестовый аквариум от 10 л воды для пары, без грунта, пещера, аэрация.

Вода для разведения: 24-26°C, dH 2-4°, pH 6-7.

Самка откладывает в пещере до 200 икринок, за которыми ухаживает самец. Инкубационный период 6-8 суток, через 1 сутки мальки плывут. Самца можно отсадить.

Стартовый корм: инфузории, коловратки.

Мальки малоподвижные, поэтому аэрация для подъема корма в толщу воды.

Половая зрелость в 6-8 мес.