



Населяют бассейн р. Амазонка.

Длина до 4,5 см.

Тело умеренно высокое, с боков уплощено.

Спина оливково-серая, бок серо-зеленый до красно-коричневого, брюхо серебристо-белое. Сзади жаберной крышки черное пятно слегка удлиненное в вертикальном направлении. Спинной плавник с черным пятном, оранжевым основанием и белым кончиком. Анальный плавник с темной каймой, бесцветный.

У самца спинной плавник удлинен, у самки более высокая спина.

Рыбы держатся в среднем и нижнем слоях воды.

Вода: 23-25°С, dН 5-15°, рН 6-7,5.

Корм: живой, заменители.

Нерест парный или в группе. Нерестовый аквариум с сепараторной сеткой на дне, на ней мелколистные растения с удлиненным стеблем.

Вода: температура на 2-3°С выше чем при содержании (25-27°С), dН до 4°, КН до 1°, рН 6-6,8, уровень 10-15 см.

Самцов и самок за неделю до посадки на нерест содержат отдельно. Нерест обычно утром. После нереста рыб удалить, аквариум затемнить. Инкубационный период 1-2 суток, мальки плывут через 3-5 суток. Дают слабое освещение.

Стартовый корм: инфузории, коловратки.

Половая зрелость в 8-12 мес.