



Населяют юго-восточную часть Бразилии.

Длина до 6 см.

Тело вытянуто в длину, эллипсоидной формы, уплощено с боков, хвостовой плавник двухлопастной. Тело серебристое, у самца с голубоватым, при возбуждении и нересте с медно-красным блеском, у самки с зеленовато-желтым.

Начинаясь над грудным плавником по телу идет продольная черно-голубая полоса, разной степени интенсивности, вплоть до конца хвостового плавника. Над ней у самца золотистая, у самки желтая полоса. У самца на хвостовом плавнике сверху и снизу полосы желтоватые пятна. Кончики непарных плавников беловатые. Плавники самца коричнево-красные, самки - желтоватые.

Мирные, стайные, подвижные рыбы, держатся в среднем слое воды.

Можно содержать в общем аквариуме, местами заросли и плавающие растения для создания тенистых мест.

Вода для содержания: 18-24°C, dH 5-20°C. pH 6,5-7,5, богатая кислородом.

Корм: живой, заменители.

Нерест парный или в стае. Нерестовый аквариум длиной от 25 см для пары, без грунта с затемненным дном, сепараторная сетка, на ней заросли растений с удлиненным стеблем и рассеченными листьями.

Вода для разведения: 24-27°C (на 2-3°C выше чем при содержании), dH 4-12°, pH 6-6,5 (0,5 объема аквариумной, 0,5 объема свежей воды).

Инкубационный период 1-2 суток, мальки плывут через 3-5 суток.

Стартовый корм: инфузории, коловратки.

Половая зрелость самцов в 6 мес., самок в 4 мес.