



Населяют, высыхающие в период засухи, водоемы Венесуэлы.

Длина до 5 см.

Тело немного вытянуто в длину с высокой спиной, светло-коричневое, в голубых, красных или темно-коричневых точках. Спинной и анальный плавники зеленоватые, хвостовой плавник коричневато-фиолетовый. Все непарные плавники в темных точках.

У самца спинной и анальный плавники высокие, с сильно вытянутым концом, хвостовой плавник с вытянутыми крайними лучами. Самка меньше, с более короткими спинным и анальным плавниками.

Сезонные рыбы, т.е. живут от наступления периода дождей до периода засухи. Отложенная ими в грунт икра выдерживает период засухи и после наступления дождей из нее выклевываются мальки.

Содержат в видовом, хорошо закрытом сверху аквариуме, т.к. рыбы прыгучи, с темным грунтом, желательно покрытым торфом, с густыми зарослями растений, т.к. рыбы пугливы и не любят сильного освещения.

Вода для содержания: 20-23°C, dH до 20°, pH 6,5-7.

Корм: живой.

Нерестовый аквариум от 5 л, на дне слой торфа. Перед посадкой на нерест самцов и самок держат отдельно в течение 2 недель. На нерест сажают обычно 1 самца и 2-4 самки.

Вода для разведения: 23-24°C, dH 4-10°, pH 6,1-6,5.

Рыбы мечут икру в торф и на него. Торф каждые 1-3 недели вынимают вместе с икрой, кладут в сито и отцеживают воду, пока она не будет стекать по каплям, затем укладывают слоем 2-3 см и слегка подсушивают, но он должен сохранять достаточно влаги, чтобы впитывать капли воды.

Такой торф хранят влажным в закрытой стеклянной или пластмассовой посуде или в полиэтиленовом пакете при 21-23°C. (Р.Бех (24) считает, что понижение температуры в ночные часы благоприятно сказывается на эмбрионах).

В течение 2 недель каждый день осматривают и удаляют погибшие икринки, затем каждую неделю контролируют с помощью лупы состояние эмбрионов. Когда их развитие окончено, что видно по темным пятнам глаз (инкубационный период длится 5-6 мес.) торф переносят в сосуд и заливают мягкой водой с температурой на 2-4°С ниже чем при хранении. Уровень воды не более 3 см. Затем температуру медленно поднимают до 25°С. Выклюнувшихся мальков переводят в выростной аквариум с таким же уровнем мягкой воды, по мере роста мальков уровень и жесткость воды постепенно повышают. В торфе обычно остается икра и его вновь подсушивают и процесс повторяют вновь.

Стартовый корм: живая пыль.

Половая зрелость в 3 мес.