Населяют северо-восточную часть Бразилии и Гайану, чаще встречаются в лесных ручьях.

Длина до 4,5 см.

Тело высокое, сильно уплощено с боков, профиль спины прямой, профиль груди и брюха очень выпуклый, острый. Спинной плавник отнесен назад, грудные плавники крупные, хвостовой плавник двухлопастной.

Спина оливковая, бок серебристый с зеленоватым, желтоватым или голубоватым оттенком. От жаберной крышки до хвостового плавника идет золотистая полоса, к ней снизу примыкают 3 черные косые полосы. Плавники бесцветные. Самец меньше, самка при рассмотрении сверху полнее.

Рыбы мирные, могут скользить по поверхности воды и выпрыгивать из нее, пролетая 3-4 м, но нередко спокойно стоят между растениями, держатся в верхнем слое воды. Можно содержать в общем аквариуме, местами заросли и плавающие растения со свисающими корнями, много открытого места для плавания. Покровное стекло поднять над водой на 8-10 см.

Вода для содержания: 24-26°C, dH 5-15°, pH 5,5-7,5, создать движение на поверхности, еженедельно сменять 1/5-1/4 объема.

Корм: живой (в особенности мелкие крылатые насекомые), заменители. Предпочитают брать с поверхности, с грунта не берут.

Нерест парный, но успешнее групповой как в общем, так и в нерестовом аквариуме длиной от 150 см, без грунта, с несколькими кустами мелколистных растений.

Вода для разведения: 25-28°C, dH 2-4°, pH 5,5-6,5. Обязательна частая смена воды и ее движение на поверхности.

Нерест при слабом освещении ночью или ранним утром. Рыбы икру не трогают, но лучше перенести ее в инкубатор со слабой аэрацией.

Инкубационный период 40 ч (28°C). Мальки плывут через 4-5 суток и держатся у поверхности. Первые сутки ночью слабое освещение, чтобы могли брать корм - инфузории, коловратки. Часть воды 2 раза в сутки заменять свежей. Выростной

аквариум накрыть, т.к. мальки в возрасте несколько недель могут при испуге выпрыгнуть из аквариума.