



Населяют водоемы восточной части Гайны и Суринам.

Длина до 6 см.

Может быть жировой плавник, но лишь в виде отдельных лучей. Основная окраска серебристо-белая до нежно желтоватой.

Спина буро-оливковая, под ней от верхней части рыла до хвостового стебля идет темная, почти черная, узкая, часто составленная из отдельных пятнышек, продольная полоса, вторая, такого же цвета широкая полоса идет от рыла через глаз до корня хвостового плавника. Плавники желтоватые или прозрачные. Основание хвостового плавника и анального плавника нежно-красного цвета.

У самца зона между продольными полосами золотистая, на рыле блестящее зелено-золотистое пятно, брюшные плавники с голубовато-белым концом.

У самки на рыле зелено-золотистая короткая линия.

При разведении вода: 26-28°C, dH до 3°, KH до 0,5°, pH 6-6,8.

Нерест парный или групповой с преобладанием самцов. Перед посадкой на нерест самок и самцов держат 2 недели отдельно. Нерестовый аквариум длиной от 40 см для пары, с уровнем воды 10-15 см. На дне сепараторная сетка, на ней кусты мелколистных растений. Самка мечет в среднем 40-80 икринок. После нереста рыб удаляют, т.к. поедают икру. Инкубационный период 1-2 суток, мальки плывут через 2-6 суток.

Стартовый корм: живая пыль. Слабая аэрация для перемешивания корма.

Половая зрелость в 7-11 мес.