



Населяют Гайану и северную часть бассейна среднего течения р. Амазонки.

Длина до 6 см.

Жировой плавник не у каждой рыбы.

Спина оливковая, бок и брюхо серебристо-белое. По телу проходят 3 черные полосы: одна, узкая, начинается над глазом и идет до основания хвостового плавника, вторая, широкая от кончика рыла до начала хвостового плавника и третья, узкая начинается перед брюшными плавниками и идет до основания анального плавника. Спинной плавник, анальный плавник и брюшные плавники с красным пятном ближе к основанию. На хвостовом плавнике у основания каждой лопасти красное пятно. У самца между 1 и 2 полосами слабые красные пятна и штрихи, первые лучи анального плавника и кончики брюшных плавников светло-голубые.

Х. Фрей пишет, что повышение атмосферного давления стимулирует нерест. В нерестовом аквариуме наряду с мелколистными растениями должны быть плавающие (риччия, пистия).

Вода для разведения: 24-27°C, dH до 3°, pH 6-6,8.

Нерест парный или групповой с преобладанием самцов. Перед посадкой на нерест самок и самцов держат 2 недели раздельно. Нерестовый аквариум длиной от 40 см для пары, с уровнем воды 10-15 см. На дне сепараторная сетка, на ней кусты мелколистных растений. Самка мечет в среднем 40-80 икринок. После нереста рыб удаляют, т.к. поедают икру. Инкубационный период 1-2 суток, мальки плывут через 2-6 суток.

Стартовый корм: живая пыль. Слабая аэрация для перемешивания корма.

Половая зрелость в 7-11 мес.

После нереста и удаления рыб аквариум затемняют .