



Населяют северную часть Австралии.

Длина до 12 см.

Тело высокое. У самца выпирающий горб на спине и груди. Основная окраска зеленовато - коричневая до оливково-коричневой, бок отливает голубоватым до желто-зеленого цветом. На жаберной крышке иногда видно красное пятно.

От глаза до основания хвостового плавника идет широкая, синяя, темно - коричневая или черная полоса в красном окаймлении. На нижней половине тела под ней проходит сужающаяся темная полоса. Плавники кирпично-красные, иногда оранжевые. Особенно насыщенно окрашены спинной плавник, анальный плавник и внешние лучи хвостового плавника.

На нерест сажают пару или группу рыб с преобладанием самок. Перед посадкой самок и самцов 1 - 2 недели держат раздельно. Нерестовой аквариум от 30 л для пары, без грунта, с кустами мелколистных растений. К. Карабач (А 5) рекомендует переднюю стенку закрыть темной бумагой, оставив боковой обзор и верхнее освещение.

Вода: 25 - 27 °С, dН 10 - 25° , рН - 8.

Нерест порционный, до 50 икринок каждый день в течение недели. Рыбы икру и потомство не трогают. Субстрат с икрой обычно переносят в инкубатор с уровнем воды до 15 см, а вместо него вносят новый. Инкубационный период 5 - 7 суток, через несколько часов мальки плывут.

Стартовый корм: живая пылью.

Половая зрелость в 8 - 10 мес.