



Населяют притоки р. Амазонка у г. Манаус (Бразилия).

Длина до 15 см.

Окраска и рисунок как у дианемы лонгибарбис, но основной тон более бежево-серый. На хвостовом плавнике чередуются черные и белые продольные полосы, остальные плавники прозрачные, коричневатые.

Иногда самец начинает поедать икру, которую тогда переносят в инкубатор.

Мирные рыбы, часто держатся группой в нижнем и средних слоях воды. При резких движениях аквариумиста, в аквариуме испуганно мечутся и могут зарываться головой в грунт.

Можно содержать в общем аквариуме с укрытиями и зарослями, создающими местами полумрак.

Вода для содержания: 22-28°C, dH 5-20°, pH 6-7,5.

Корм: живой, заменители.

Нерест парный, можно в видовом аквариуме. Его стимулирует понижение атмосферного давления, а по ряду сообщений любителей и понижение температуры на 2-4°C. Самец строит гнездо из пены под крупным листом растения, плавающим на поверхности, который можно заменить диском из пластмассы Ø 20 см.

Самка приклеивает к нему икру (до 600 шт.), хотя может приклеить и на стекло аквариума рядом с гнездом. Икру охраняет самец.

Инкубационный период 4-5 суток, мальки плывут через 2 сутки.

Стартовый корм: коловратки. Мальки в первые дни чувствительны к понижению температуры.

Лучше 24-28°C. Половая зрелость в 1-1,5 года.