



Населяют северную и центральные части Ю. Америки. Держатся в спокойных водоемах с илистым дном.

Длина до 18 см, в аквариуме до 15 см.

Тело вытянуто в длину, мало уплощено с боков, с почти параллельными линиями профиля спины и брюха, бок покрыт 2 рядами костных пластинок, спина ими покрыта неполностью. 2 пары длинных усиков на верхней челюсти и 1 пара коротких - на нижней.

Тело темного оливково-зеленого до темно-серого цвета с голубым или фиолетовым отливом и темными пятнами. Плавники серые с темными пятнами, иногда с оранжевой или красноватой каймой.

Самец интенсивнее окрашен и у него более мощный первый луч грудного плавника.

Рыбы имеют дополнительное кишечное дыхание, что дает возможность передвигаться по суше в поисках воды. Донные сумеречные рыбы. Можно содержать в общем аквариуме с рыбами сходного размера, причем половозрелых парами, т.к. самцы дерутся из-за самок. Аквариум с крупными и плавающими растениями, укрытиями из коряг и камней.

Вода для содержания: 18-28°C, dH до 30°, pH 6-8.

Корм: живой, в том числе мелкие рыбы.

Нерест парный как в общем, так и в нерестовом аквариуме (можно без грунта, с темной подложкой), с укрытием, длиной от 80 см для пары. На поверхности воды должен быть крупный лист, который можно заменить диском из пенопласта Ø10 см. Слив воды тонкими струями на поверхность стимулирует нерест.

Самец строит под листом гнездо из пены, в которое самка откладывает икру (до 200 шт.), после чего отгоняется самцом, ухаживающим за икрой.

Инкубационный период 5 суток при 26°C, мальки плывут через 3 суток.

Стартовый корм: коловратки.