



Населяют южную часть Мексики.

Длина самца до 5,5 см, самки до 7 см.

Тело несколько вытянуто в длину, высокое, уплощено с боков. Нижние лучи хвостового плавника могут быть немного удлинены.

Передняя часть тела самца желтоватая, задняя зеленоватая до голубоватой. На боку разбросаны черного или коричневого цвета пятна, иногда образующиеся продольные ряды, а также 3-6 поперечных полос. На корне хвостового плавника видны 2 черных пятна. Хвостовой плавник желтоватого до красного цвета, спинной плавник желтый с темным рисунком и черной каймой.

Тело самки оливково-коричневого или коричневато-серого цвета с красноватыми зигзагообразными линиями на боку. Селекционеры вывели много форм, в которых преобладают голубой, желтый до красного и черный цвета.

При наличии густой растительности, в том числе плавающей и хорошего питания почти не преследуют мальков.

Вода: 22-26°C, dH 8-25, pH 7-8.

Корм: живой, растительный, заменители (любят водоросли).

Нерест в общем аквариуме. Беременность до 5 недель. Самку перед родами можно перевести в отдельный аквариум с густыми зарослями и плавающими растениями, а после родов отсадить (обычно 30-80 мальков), т.к. поедают потомство.

Стартовый корм: коловратки, науплии циклопа и артемии, нематоды. На нерест сажают после 6-8 мес.